

Заходи боротьби з бур'яном ПОВИТИЦЯ ПОЛЬОВА

Яку наносить шкоду:

Уражені рослини сильно слабнуть, призупиняються в рості і розвитку, поступово гинуть. Насіння отруйне.рім того, повитиці часто є переносниками вірусів та інших хвороб з одних рослин на інші. У зв'язку з такою великою шкодочинністю повитиць висівати заражений посівний матеріал забороняється.

Бур'ян внутрішнього карантину (він вже є на території України, при виявленні його необхідно ЗНИЩИТИ !!!)



Заходи боротьби:

1. Заборона завезення у вільні райони з регіонів розповсюдження бур'яну;
 2. Обов'язковий карантинний огляд та лабораторна експертиза;
 3. Обстеження с/г угідь на виявлення бур'яну у період вегетації;
 4. При виявленні вогнища – запровадження особливого карантинного режиму.
- При виявленні бур'яну вантаж підлягає поверненню відправникові або очищенню під контролем держінспектора з карантину рослин. При неможливості очистки – переведення насіннєвого матеріалу в категорію зернопродуктів з подальшою переробкою. Кормові відходи переробляють з перемелюванням до часток не більше 1 мм, а малоцінні відходи знищують під контролем держінспектора з карантину рослин спалюванням.
- В районах масового розповсюдження повитиць в ґрунті накопичуються великі запаси насіння. Тому, особливу увагу слід приділяти заходам, спрямованим на виснаження цих запасів і недопущення повторного засмічення ними ґрунту та урожаю культур. Рослина, уражена повитицеюЕфективним засобом боротьби є дотримання сівозміни з висівом культур, які не уражуються, або слабо уражуються повитицею – зернових, соняшника, гарбузових, а також застосування пару. Обробіток пару слід починати з осінньої оранки і подальший пошаровий обробіток ґрунту. Весною перед посівом слід провести 2-3 культивації. Догляд за посівами необхідно починати з боронування до появи сходів і після. Протягом вегетації слід проводити міжрядні обробки і знищувати

окремі уражені повитицею рослини.

Вогнища уражених посівів необхідно викошувати з захватом півтораметрової гарантійної зони навколо цвітіння бур'яну. Скошену масу висушувати, виносити за межі поля і спалювати. Вогнище необхідно утримувати в стані чорного пару, або обробляти гербіцидами. В посівах багаторічних трав і на необроблюваних землях повитицю необхідно часто низько скошувати до цвітіння.

Залишки бур'яну по скошеній стерні можна знищувати механічним шляхом випалювання, або хімічним методом.

Перед збиранням урожаю культурних рослин вогнища заражені повитицею необхідно скошувати і збирати окремо. Зберігати засмічений урожай необхідно окремо від чистого.

У садах уражені пагони потрібно вирізати до цвітіння повитиць, пристовбурові кола все літо утримувати у стані чорного пару, міжряддя культивувати чи засівати стійкими до ураження культурами (злакові, люпин, горох).

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою : м.Чернівці,вул.Надрічна 23 Б. тел. (0372)56-33-17 (066)8436355

Провдний фахівець фтосанітарних процедур Чернівецької обласної фіто санітарної

лабораторії

Олексій Русановський